

9.38x20.18	1	עמוד 60	יחד נאמן - כותרת	14/07/2020	73702837-7
40256 - תרופות					

רפואה בעריכת: נ. קצין

חודש המודעות להפטיטיס:

רק רבע מנשאי נגיף הפטיטיס C מאובחנים

■ פרופ' בן ארי, המרכז למחלות כבד בשיבא: "איתור הנשאים הקיימים באוכלוסייה ומתן הטיפול האנטי-נגיפי הכלול בסל הבריאות יכולים להביא למיגור הנגיף בישראל בתוך עשור"

בישראל ישנם כ-70 אלף נשאים של נגיף הפטיטיס C, רק כ-25% מתוכם מאובחנים. מרבית אלה שאינם מאובחנים, אינם חשים בתסמינים כלשהם. נתונים אלה מתפרסמים לרגל חודש המודעות הבינלאומי להפטיטיס.

פרופ' זיו בן ארי מנהלת המרכז למחלות כבד, מרכז רפואי שיבא תל השומר, מציינת כי זיהום בנגיף הפטיטיס C (צהבת) הוא הגורם השכיח ביותר למחלת כבד כרונית. כ-70 מיליון אנשים בעולם נושאים את הנגיף, ובכל שנה נדבקים עוד כ-4 מיליון איש. קבוצות הסיכון באוכלוסייה בישראל הם אנשים שקבלו עירוי דם לפני 1992, עולים ממדינות חבר העמים, אסירים ועוד.

דרכי ההדבקה בנגיף כוללים מתן עירוי דם ותוצריו (לפני 1992), שימוש במחטים בלתי סטריליות, ואם נשאית המדביקה את היילוד. בעת חשיפה ראשונה לנגיף, 20% מהנחשפים יכריאו באופן עצמוני, ואילו 80% יפתחו מחלת כבד כרונית. 20-30% מכלל החולים יפתחו במשך מהלך איטי של 20-30 שנה שחמת הכבד, מצב בו רקמת הכבד מתחלפת ברקמה צלקתית שאיננה מתפקדת. תיתכן גם סוכרת, מחלת כליה ופרקים וסרטן של בלוטות הלימפה. ההמלצה היא לבצע בדיקת דם לגילוי נגיף הפטיטיס C בקרב קבוצות הסיכון על מנת לאבחן את המחלה כבר בשלבים הראשונים ולהציע טיפול אנטי-נגיפי. מדובר בבדיקת דם פשוטה אותה ניתן לבצע בקלות אצל רופא המשפחה. בשנתיים האחרונות נכנסו לשימוש בסל הבריאות בישראל תרופות חדשות ופורצות דרך לטיפול במחלה, שפועלות ישירות כנגד הנגיף ומעלות באופן משמעותי את הסיכוי לריפוי מלא. התרופות הוכנסו לסל לחולים עם הפטיטיס C בכל הסוגים ובכל דרגת חומרה של המחלה. "ישנה חשיבות רבה לאיתור הנשאים של הנגיף בקרב קבוצות הסיכון. איתור הנשאים בישראל ומתן הטיפול האנטי-נגיפי החדש יכול להביא למיגור המחלה תוך עשור בישראל".

חוליו בורמן, מנכ"ל עמותת חץ, מוסיף: "כדי למנוע הדרדרות של חולים בגל השני של הקורונה, אני קורא לשר הבריאות, לקדם לאלתר את בדיקות האיתור של חולי הפטיטיס סי. חייבים למצוא את החולים כדי לטפל בהם".